

COLPOSCOPIA MAS BIOPSIA DE CERVIX

Que es? Procedimiento donde se toma una muestra del cuello uterino, en caso de lesión o una citología cervicouterina anormal, de preferencia se realiza una colposcopia o prueba de Schiller (Yodo).

Para qué? Obtener una muestra para estudio de histopatológico.

Como lo van a hacer?

Una vez ubicada en la camilla ginecológica se procederá a la introducción del espéculo para la visualización y fijación del cuello, posteriormente se procede a la aplicación en el cuello del cérvix: ácido acético al 5% (vinagre) para limpiarlo y visualizar con el colposcopio (aparato que magnifica e ilumina el cuello) para poder verlo mejor y evaluar su aspecto, quizás sienta un poco de picor con la aplicación, el colposcopio no la tocará. El examen llevará entre 5 y 7 minutos.

Una vez ubicada la lesión se procede a aplicar lugol para visualizar las zonas anormales y proceder a la toma la biopsia, que puede causarle algún dolor durante unos segundos que varía de una sensación de leve pellizco a una de retortijones.

Una vez terminada la toma de la biopsia se aplicara solución de monsel (sulfato férrico) el cual detiene el sangrado que se presenta con la toma de la biopsia, retira el espéculo y se dan indicaciones, cuidados.

Seguramente también manchará algo o tendrá una leve hemorragia durante 1 a 2 semanas y un exudado vaginal acuoso que dura de 2 a 4 semanas. Se le pedirá que no tenga relaciones durante 3 ó 4 semanas, para darle tiempo al cuello uterino de sanar adecuadamente

Recomendaciones:

Venir con ropa cómoda, preferiblemente falda.

Informar al médico si es alérgica a algún medicamento

Traer toalla higiénica ya que puede presentar leve sangrado despues del procedimiento

Durante 3 dias previos al examen no debe utilizar cremas o duchas vaginales, ovulos, desodorantes intimos o tampone.

No tener relaciones sexuales 72 horas previas al examen.

Al momento de asistir al examen no debe presentar sangrado menstrual.

Riesgos: Con la toma de la biopsia del cuello uterino, puede presentar hemorragia vaginal leve durante un día o dos, dolor vaginal o vulvar durante 1 o 2 dias.

Informe a su médico o enfermera, si presenta dolor abdominal intenso, fiebre, escalofrios, sangrado vaginal abundante.

