


## ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- Debe presentarse en la hora indicada para la programación del procedimiento 30 minutos antes
- Debe estar en ayunas
- Usar ropa cómoda
- Disponer de tiempo para la prestación del servicio
- Informar a su médico si es alérgico a algún medicamento



## DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

Lo trasladarán a una habitación hasta donde permanecerá en observación por unos minutos. Es posible que se sienta somnoliento y con náuseas al principio. Le darán medicamentos para aliviarle el dolor. Si le colocaron un tubo de drenaje, le explicarán cómo debe cuidarlo. Pídale a un familiar o a un amigo adulto que lo conduzca a su casa cuando esté listo para regresar. Siga las instrucciones del médico para recuperarse:

- Tome los medicamentos recetados siguiendo exactamente las indicaciones.
- Cúidese la incisión tal como le hayan indicado.
- Evite las actividades enérgicas hasta que el médico le dé permiso para hacerlas.

## CUÁNDO DEBE LLAMAR AL MÉDICO

Asegúrese de tener el número de teléfono de su médico. Después de regresar a su casa, llame a ese número si tiene cualquiera de estos síntomas:

- Dolor en el pecho o dificultades para respirar (**llame al 911**)
- Fiebre de 100.4°F (38°C) o superior, o según le indique su proveedor de atención médica
- Dolor en el sitio de la biopsia
- Dificultad para girar la cabeza
- Síntomas de infección en la zona de una incisión, como un aumento del enrojecimiento o de la hinchazón, calor, empeoramiento del dolor o supuración maloliente
- Sangrado o amoratamiento en el sitio de la incisión
- Falta de sensibilidad u hormigueo en la boca, la mandíbula, el cuello, el brazo o el hombro
- Problemas para hablar o para tragar
- Voz cada vez más ronca

## SEGUIMIENTO

Durante sus visitas de control, el médico revisará si las zonas afectadas están sanando bien. Si tiene un tubo de drenaje, se lo quitarán 1-2 días después del procedimiento. Las suturas o grapas quirúrgicas se quitan 7-10 días después del procedimiento. Su médico le explicará los resultados de la biopsia. Si se encontró cáncer, podrían ser necesarios tratamientos adicionales.

## RIESGOS Y POSIBLES COMPLICACIONES

Existe una probabilidad de tener una infección en el sitio de la biopsia. Una infección puede tratarse con antibióticos. Llame a su médico de inmediato si:

- El dolor dura más de una semana.
- Tiene enrojecimiento, mucha hinchazón, sangrado o pus en el sitio de la biopsia.
- Tiene fiebre.
- Hay acumulación de líquido en la zona donde se extrajo el ganglio linfático. La mayoría de las veces, esto ocurre cuando se extraen los ganglios linfáticos que están dispuestos en hileras desde debajo del brazo hasta la clavícula (ganglios linfáticos axilares). Esto puede suceder inmediatamente después de la cirugía o incluso meses o años más tarde. La mayoría de las personas que se someten a una biopsia de los ganglios linfáticos no tienen problemas de acumulación de líquido.
- Siente adormecimiento en la piel cercana al sitio de la biopsia. Esto puede estar causado por un daño en los nervios. (puede ser temporal o permanente)
- Lesión a los nervios sensoriales, que afectan a la sensación en el lóbulo de la oreja, el cuello o la piel del cuello (puede ser temporal o permanente)
- Absceso en el cuello
- Formación de cicatrices
- Reapertura de la incisión
- Reparación del agrandamiento del ganglio linfático
- Riesgos de la anestesia (su anesthesiólogo hablará con usted sobre esto)